Tavinex®

ANTIGRIPAL

PARACETAMOL - BUTETAMATO CITRATO
CLORHIDRATO DE FENILEFRINA - CAFEINA

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
INDUSTRIA ARGENTINA. VENTA LIBRE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACÍON ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE TAVINEX ANTIGRIPAL?
Cada comprimido recubierto contiene: Paracetamol 500 mg, Butetamato Citrato 40 mg; Cafeína 30 mg; Clorhidrato de Fenilefrina 8 mg. Almidón de Maíz, Lactosa Monohidrato, Povidona K30, Goma Guar, Dióxido de Silicio Coloidal, Polisorbato 80, Estearato de Magnesio, Polietilenglicol 6000, Cubierta: Talco, Dióxido de Titanio, Alcohol Polivinílico, P.E.G. 3350.

NO USAR SI EL ENVASE O EL BLISTER NO ESTÁN INTACTOS.

ACCIÓN: Analgésico-Antifebril-Descongestivo-Antitusivo.

¿PARA QUE SE USA TAVINEX ANTIGRIPAL?
Se encuentra indicado para el alivio de estados gripales y/o resfríos, reducir la fiebre y la congestión de la mucosa de la vía aérea superior (nasal-faríngea) y para el alivio sintomático de dolores (de cabeza, musculares) leves o moderados.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR TAVINEX ANTIGRIPAL?
Si usted sabe que es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula. Niños menores de 12 años. Mujeres embarazadas o que estén amamantando. Si a usted la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios le producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas. Si usted padece úlcera gástrica intestinal o antecedentes de úlcera. En caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo. Si usted posee deficiencia de la enzima glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (enzima presente en los glóbulos rojos, cuya deficiencia puede causar anemia). Si usted padece el Síndrome de Gilbert (alteración hereditaria asociada a un elevado nivel de bilirrubina). Si usted padece glaucoma de ángulo estrecho o problemas cardíacos (Ej.: aumento de la frecuencia cardíaca). Si Ud. está o ha estado en los 20 días anteriores a la toma de este medicamento con medicamentos usados para la depresión y/o enfermedad de Parkinson.

CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO.
Este medicamento ha sido desarrollado para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Emplear con precaución si usted padece problemas cardíacos, diabetes, enfermedades de la próstata o hipertensión arterial. Si usted está tomando algún otro medicamento, consulte con su médico antes de tomar este medicamento. Si tiene antecedentes de enfermedades de tracto digestivo superior este producto debe ser administrado con precaución, por la posibilidad de gastritis, úlcera gastroduodenal o sangrado gastrointestinal. Este producto puede producir daño hepático cuando se ingiere en dosis mayores a las recomendadas. Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebidas alcohólica consulte con su médico antes de tomar este medicamento. No ingiera otra especialidad medicinal que contenga paracetamol u otro analgésico o antifebril conjuntamente con este producto. Consulte con su médico antes de ingerir este producto especialmente si: Usted toma al mismo tiempo anticoagulantes, anticonvulsivantes u otro antiinflamatorio o toma medicamentos para la presión arterial, para el corazón o Parkinson, antidepresivos o para la tiroides.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?
No utilice este producto si al mismo tiempo se encuentra en tratamiento con drogas inhibidoras de la monoaminooxidasa (IMAO) (ciertas drogas para la depresión, trastornos psiquiátricos, emocionales o enfermedad

de Parkinson) o durante las dos semanas posteriores a la suspensión de las mismas, dado que puede precipitarse una crisis hipertensiva.
Si usted no está seguro si un medicamento que utiliza contiene IMAO consulte previamente a su médico.
No administre TAVINEX ANTIGRIPAL a menores de 12 años, no utilice este producto durante el embarazo, periodo de lactancia, en caso de insuficiencia renal, hipertensión arterial, diabetes o agrandamiento prostático sin consultar antes al médico.
Evite ingerir simultáneamente con alcohol.
No use este producto por más de 5 días para calmar dolores, ni por más de 3 días para bajar la fiebre.
Si usted toma al mismo tiempo antiinflamatorios no esteroides, puede suceder que aumenten sus efectos tóxicos, por lo que debe consultar al médico.
Si los síntomas por los cuales está utilizando TAVINEX ANTIGRIPAL PERSISTEN POR MÁS TIEMPO QUE LOS INDICADOS EN ¿CÓMO USAR ESTE MEDICAMENTO?, suspenda su uso y consulte a su médico.

¿COMO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Para aliviar los síntomas y signos de la gripe: Tomar 1 comprimido recubierto cada 8 horas.
Dosis máxima: 3 comprimidos por día.
No duplicar dosis. No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días para el dolor.

MODO DE ADMINISTRACIÓN:
Tomar con abundante agua 1 comprimido recubierto cada 8 horas.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI USÉ MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

CENTROS DE TOXICOLOGÍA:
Teléfonos en Buenos Aires: (Marque 011 si reside en el interior del país)
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez - Sánchez de Bustamante 1399 – Buenos Aires
4962-2247 ó 4962-6666
Policlínico Posadas - Martínez de Hoz y Marconi, Haedo.
Conmutador 4658-3001/20 - Toxicología interno 314 ó 4654-6648, 4658-7777
Facultad de Medicina de Bs. As. - (Hospital de Clínicas Gral. San Martín)
Paraguay 2351 – Buenos Aires. División Toxicología – Dto. De Medicina 3er. Piso, Sala II
4961-5452/6001/04/34/46 4962-4022/29/81/83/96 Int. 480
Servicio de Toxicología del Hospital Pedro Elizalde (Ex Casa Cuna)
Av. Montes de Oca 40 – Buenos Aires. 4301-2215

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA? 0800-333-1234 ANMAT RESPONDE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

FORMA DE CONSERVACIÓN: Proteger de la luz directa; (desde 15°C hasta 30°C)

Presentaciones: Envases conteniendo 8 y16 comprimidos recubiertos.
Elaborado en:
Cuenca 648 - Villa Lynch - Pcia. de Bs. As.
Galicia 2652 - C.A.B.A.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado No: 49.724
Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: 05/2018

Dirección técnica: Diego R. Montenegro – Farmacéutico.
Laboratorio Biosintex
Salom 657
C1277ABG - C.A.B.A.

Biosintex
LABORATORIO

405-12-009/01