

Bucoangin FORTE®

Tirotricina - Benzocaína

Caramelos
VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE BUCOANGIN FORTE?

BUCOANGIN FORTE Sabor Mentol

Cada caramelo contiene:

TIROTRICINA 1 miligramo, BENZOCAÍNA 20 miligramos.
Excipientes: Clorofila 5%, Mentol, Eucalipto, Azúcar y Jarabe de glucosa.

BUCOANGIN FORTE Sabor Limón -LIBRE DE AZÚCAR-

Cada caramelo contiene:

TIROTRICINA 1 miligramo, BENZOCAÍNA 20 miligramos.
Excipientes: Sabor limón, Amarillo de quinoleína, Isomaltosa.

NO USAR SI EL ENVASE NO ESTÁ INTACTO

ACCIÓN: Bactericida y antiséptico bucofaringeo con acción anestésica.

¿PARA QUÉ SE USA BUCOANGIN FORTE?

Alivio sintomático de los procesos inflamatorios bucofaringeos tales como dolor de garganta, aftas, ampollas y/o llagas en la boca.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR BUCOANGIN FORTE?

NO USE este medicamento si usted es alérgico a la Tirotricina o a algún otro componente de la fórmula. **BUCOANGIN FORTE no debe ser administrado a niños menores de 12 años.**

CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO.

Este medicamento ha sido indicado para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
No utilizar BUCOANGIN FORTE en caso de lesiones muy extensas en boca o garganta.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento produce habitualmente una disminución transitoria de la sensibilidad normal de la lengua y la boca, por lo cual se recomienda dejar pasar una hora para evitar mordeduras o atragantarse al ingerir alimentos.

CONSULTE A SU MÉDICO Y SUSPENDA EL USO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Si los síntomas por los cuales está utilizando BUCOANGIN FORTE empeoran o no mejoran en 48 hs.
- Si el dolor de garganta se acompaña de fiebre, náuseas o

vómitos, dolor de cabeza, hinchazón o enrojecimiento o dificultad para respirar.

- Si aparecen signos o síntomas de hipersensibilidad (reacción alérgica).

ESTE MEDICAMENTO NO ES UNA GOLOSINA.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Exclusivamente para adultos y niños mayores de 12 años: Se aconseja dejar disolver en la boca 1 caramelo cada 6 horas. No se debe tragar ni masticar.
Dosis máxima: 4 caramelos por día.
NO EXCEDER LA DOSIS DIARIA MÁXIMA.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI USÉ MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

CENTROS DE TOXICOLOGÍA

Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" (Gallo 1330, CABA): 0800-444-8694 / (011) 4962-6666 / 2247

Hospital General de Niños Pedro Elizalde (Montes de Oca 40, CABA): (011) 4363-2100 / 2200 int.6217

Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández (Cervino 3356 C1425AGP CABA): (011) 4808-2600

Hospital Nacional Posadas (Av. Marconi y Pte. Illia, El Palomar, Buenos Aires): (011) 4654-6648 / 4658-7777 / Línea Gratuita Nacional: 0-800-333-0160

Hospital De Niños "Sor María Ludovica" (Calle 14 1631, B1904 La Plata, Buenos Aires): (0221) 453-5901 / Línea Gratuita: 0-800-222-9911

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA? 0800-333-1234 ANMAT RESPONDE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

FORMA DE CONSERVACIÓN

Mantener el envase cerrado entre 15 y 30 °C.

Presentaciones: Blister conteniendo 9 caramelos.

Elaborado en: Ruta Provincial N° 36 N°11000 e/Av. Ing. Allan, calle N°611, calle N° 517 y calle N°600 Parque Industrial Pibera, localidad El Pato, partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

Dirección Técnica: Diego R. Montenegro - Farmacéutico Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 48.531.

Fecha de última revisión del prospecto: 11/2020

BIOSINTEX S.A.

Salom 657 C1277ABG C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina.

Servicio de Atención al Consumidor
0810 777 6327
E-mail: consultas@biosintex.com.ar
www.biosintex.com.ar

 **Biosintex**
LABORATORIO