

Irricutan®

Difenhidramina HCl
Calamina
(Óxido de zinc + Óxido de hierro)

Quemaduras de sol
Picaduras de insectos
Sarpullido

Loción

Calma la picazón
Antialérgico

Venta libre

Cont. Neto
100 ml



 Biosintex

Irricutan® Loción

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL MEDICAMENTO, ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

¿Qué contiene Irricutan Loción? Cada 100 mililitros de loción contiene: Difenhidramina clorhidrato: 1.000 gramos, Calamina (Óxido de Zinc + Óxido de Hierro): 8.100 gramos. **Excipientes:** Alcanfor, Etanol, Glicerina, Metilcelulosa, Óxido de Hierro, Agua purificada.

Acción: Irricutan calma la picazón, antialérgico. **¿Para qué se usa?** Irricutan se usa ante reacciones alérgicas de la piel, picazón, quemaduras de sol, picaduras de insectos, irritación de la piel.

¿Qué personas no pueden usar Irricutan? No use este medicamento si es alérgico a alguno de sus ingredientes. No use este medicamento en niños menores de dos años. **¿Qué cuidados debo tener antes de usar este medicamento?** Irricutan no debe aplicarse en piel con ampolla o lastimaduras. No aplicar simultáneamente con otros productos. No aplicar en zonas amplias de la piel. **¿Qué cuidados debo tener mientras se usa este medicamento?** Evitar el contacto con los ojos y mucosas. En caso de ardor suspender el tratamiento. **AGITE BIEN ANTES DE USAR.**

SOLO USO EXTERNO. ¿Cómo se usa este medicamento? Niños a partir de dos años de edad y Adultos: Aplicar exclusivamente en forma externa sobre las zonas afectadas tres o cuatro veces al día. Si los síntomas persisten luego de los 7 días consultar con el médico. **Conservar en lugar fresco y seco al abrigo de la luz.**

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, si use más cantidad de la necesaria o ingesta accidental? Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica. Centros de Toxicología: Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" Tel. (011) 4062-6666/2247 Hospital Gral. de Niños "Dr. Pedro de Elizalde" Tel. (011) 4300-2115/4362-6063 Hospital Nacional "Prof. A. Posadas" Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777 - Centro de Asistencia Toxicológica de La Plata Tel.: (0221) 451-5555 **¿Tiene usted alguna pregunta?** ANMAT Responde: 0800-333-1234 Consultas Biosintex: 0810-777-6327 consultas@biosintex.com - www.biosintex.com.ar **MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Presentación: Envase conteniendo 100 mililitros, Esp. Med. Aut. M. Salud - Certificado Nº 42709

Elaborado por: Laboratorio BIOSINTEX SA

Salm 657 - C1277ABG I C.A.B.A.

Director Técnico: Diego R. Montenegro, Farmacéutico.

Facha de última revisión: 08/14

INDUSTRIA ARGENTINA.

 Biosintex
LABORATORIOS

Irricutan®

Oxido de zinc
Difenhidramina HCl

Quemaduras de sol
Picaduras de insectos
Sarpullido

Loción

Calma la picazón
Antialérgico

Incolora



Venta libre

Cont. Neto
100 ml

 Biosintex

Irricutan® Loción Incolora

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL MEDICAMENTO, ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

¿Qué contiene Irricutan Loción Incolora? Cada 100 mililitros de loción contiene: Oxido de Zinc 2,0 gramos, Difenhidramina clorhidrato 1,0 gramo, Oxido de Hierro, Alcanfor, Etanol 96%, Glicerina, Melilictulosa, Agua purificada.

Acción: Irricutan calma la picazón, antialérgico.

¿Para qué se usa? Irricutan se usa ante reacciones alérgicas de la piel, picazón, quemaduras de sol, picaduras de insectos, irritación de la piel. **¿Qué personas no pueden usar Irricutan?** No use este medicamento si es alérgico a alguno de sus ingredientes. No use este medicamento en niños menores de dos años.

¿Qué cuidados debo tener antes de usar este medicamento? Irricutan no debe aplicarse en piel con ampolla o lastimaduras. No aplicar simultáneamente con otros productos. No aplicar en zonas amplias de la piel. **¿Qué cuidados debo tener mientras se usa este medicamento?** Evitar el contacto con los ojos y mucosas. En caso de ardor suspender el tratamiento.

AGITE BIEN ANTES DE USAR. SOLO USO EXTERNO.

¿Cómo se usa este medicamento? Niños a partir de dos años de edad y Adultos: Aplicar exclusivamente en forma externa sobre las zonas afectadas tres o cuatro veces al día. Si los síntomas persisten luego de los 7 días consultar con el médico.

Conservar en lugar fresco y seco al abrigo de la luz.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, si use más cantidad de la necesaria o ingesta accidental? Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica, Centros de Toxicología: Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" Tel.:(011) 4062-6666/2247 Hospital Gral. de Niños "Dr. Pedro de Elizalde" Tel.:(011) 4300-2115/4362-6063 Hospital Nacional "Prof. A. Posadas" Tel. (011) 4654-6648/4658-7777 Centro de Asistencia Toxicológica de La Plata Tel. (0221) 451-5555

¿Tiene usted alguna pregunta? ANMAT Responde: 0800-333-1234 - Consultas Biosintex: 0810-777-6327 | consultas@biosintex.com | www.biosintex.com.ar

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Presentación: Envase conteniendo 100 mililitros.

Esp. Med. Aut. M. Salud - Certificado Nº 42709

Elaborado por: Laboratorio BIOSINTEX SA

Sakm 657 - C1277ABG I C.A.B.A.

Director Técnico: Diego R. Montenegro, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 08/14

INDUSTRIA ARGENTINA.

 Biosintex