

Labioderm®



Aciclovir 5,0 %

Venta libre.

Industria Argentina

CREMA - USO EXTERNO

FÓRMULA: Envase por 10 g Fórmula cuali-cuantitativa:

Cada 100g de crema contiene:

Aciclovir.....	5g
EDTA disódico.....	0,1g
Fosfato Monosódico dihidrato	0,4 g
Metilparabeno.....	0,15g
Propilparabeno.....	0,05 g
Propilenglicol.....	2 g
Cetomacrogol 1000.....	3,0 g
Alcohol Cetosteárico.....	8,0 g
Vaselina sólida.....	10,0 g
Vaselina líquida.....	3,0 g
Hidróxido de sodio c.s.p.....	pH(4,0-7,0)
AguaPurificada c.s.p.....	100 g

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antiherpético (para el tratamiento de herpes labial y facial)

INDICACIONES:

Este producto está indicado para mejorar los síntomas y las lesiones cutáneas previamente diagnosticadas por un médico, de labios y cara producidas por el virus del herpes en personas con las defensas normales.

Esta enfermedad se manifiesta como lesiones que consisten en máculas (manchas) eritematosas (enrojecidas) seguidas de pápulas (lesión pequeña, sólida y levantadas no plana) que progresan a la formación de vesículas (ampollitas) dolorosas y pruriginosas, (que dan picazón), y que entre 24-48 horas darán lugar a ulceraciones y posterior formación de costras.

El herpes es una infección causada por el virus del herpes simple (VHS), un agente que ataca los nervios que inervan los labios y la piel que los rodea. Los sitios más frecuentemente afectados son: la unión muco-cutánea o el borde de los labios de la boca, el mentón y el septum nasal. La infección sin tratamiento en personas con las defensas normales dura entre 8 a 10 días pero puede continuar hasta los 14 días. La eficiencia de este producto mejora con la precoz aplicación., pudiendo disminuir la aparición de los síntomas. Asimismo también puede aliviar los síntomas y lesiones cuando la lesión ya está presente, teniendo en cuenta que sólo 2 o 3 días después de la caída de la costra puede considerarse que la infección está curada. Una vez que ha tenido la infección por primera vez, los factores que favorecerían la reactivación serían: el frío, el resfrío, la fatiga, la menstruación, el estrés emocional, procedimientos dentales, el sol, el viento.

MODO DE USO:

Adultos y niños mayores de 12 años de edad: coloque la crema tan pronto como su experiencia reconozca, por la presencia de síntomas, el inicio de las lesiones anteriormente descritas.

1) Lave sus manos antes y después de la aplicación de la crema.

2) Aplique la crema hasta 5 veces al día cada 4 horas (omitendo la aplicación nocturna) hasta cubrir completamente el área afectada.

3) Use la crema por 5 días y de ser necesario, la aplicación puede continuar por 5 días más. Si al cabo de 10 días los síntomas persisten o empeoran consulte con su médico.

No exceda las dosis recomendadas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Aplique la crema sólo sobre los labios y la cara. No use la crema en el interior de la boca. Este producto no debe ser usado para tratar las úlceras de la boca (aftas). No use este producto si tiene hipersensibilidad al Aciclovir o a cualquiera de sus ingredientes. No use este producto en las infecciones virales que afecten los ojos o los genitales. No pinche las vesículas ni urgue o despegue la costra. Evite compartir elementos de higiene personal o para la alimentación.

Si el dolor o las lesiones persisten o se agravan consulte a su médico. Asimismo consulte a su médico si está en tratamiento por una afección que altere su sistema inmunológico.

REACCIONES ADVERSAS:

Puede producir un leve enrojecimiento, picazón, sequedad o descamación de la piel en los sitios de aplicación. También se han observado reacciones alérgicas como edemas de labios, cara o párpados, enrojecimiento cutáneo (rash). Ante la aparición de cualquiera de esos signos suspenda el uso del medicamento y consulte inmediatamente al médico.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al Aciclovir. Niños menores de 12 años de edad. Embarazo y lactancia.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 y (011) 4962-2247.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 y (011) 4658-7777

PRESENTACIONES:

Envase conteniendo pommo con 10 g.

CONSERVACION:

Conservar a temperatura ambiente menor a 25°C.

No refrigerar.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PARA USO EXTERNO SOLAMENTE

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO

SI USTED ESTA EMBARAZADA O DANDO DE MAMAR, CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO.

Esp. Med. Aut. M. Salud

Certificado N° 53524

Director Técnico:

Diego R. Montenegro, Farmacéutico

Laboratorio Biosintex S.A

Elaborado en: Salom 657 C1277ABG C.A.B.A

0810 777 6327

Fecha de última revisión:07/15



Servicio de atención al consumidor 0810 777 6327

E-mail:consultas@biosintex.com.ar

www.biosintex.com.ar



Biosintex
LABORATORIO