

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 1%
Povitol
INCOLORO



SOLUCIÓN
SPRAY
Cont. Neto
60 ml

VENTA LIBRE
INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO.

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.

Si los síntomas persisten o empeoran por más de 48 horas consulte con su médico.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto no deseado no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Informe a su médico o farmacéutico si está usando, o ha usado recientemente, cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

Qué contiene Povitol Incoloro:

Cada 100 ml de solución spray contiene: Clorhexidina digluconato (equivalente a 5 g de solución de Clorhexidina digluconato 20%) 1,00 g. Agua purificada c.s.p. 100,00 ml.

Acción terapéutica:

Desinfectante - Antiséptico.

¿Para qué se usa Povitol Incoloro?

Se utiliza para desinfectar la piel en caso de pequeñas heridas, cortes superficiales, quemaduras leves y raspaduras.

¿Cómo usar Povitol Incoloro?

Deberá aplicarse sólo en heridas leves. Rociar con el spray en forma homogénea sobre la herida desde una distancia

aproximada de 10 cm. Esperar un lapso breve hasta que la película húmeda se haya secado y, si es necesario, proceder a cubrir la herida con un apósito. Una o dos aplicaciones por día son suficientes.

Los apósitos deberán ser aplicados sobre heridas secas y limpias.

Las heridas profundas o con sospecha o evidencia de infección, deberán ser tratadas por el médico.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar Povitol Incoloro?

No use si usted es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula.

No utilizar en niños menores de 5 años.

No usar al mismo tiempo que esté utilizando otros productos que contengan otros desinfectantes o antisépticos tópicos.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando Povitol Incoloro?

Durante el período de utilización del producto pueden aparecer los siguientes efectos adversos: reacciones de alergia, irritación local, picazón y ardor.

En caso de contacto accidental con ojos u oídos lavar inmediatamente con abundante agua.

Si los síntomas persisten o empeoran por más de 48 horas consulte con su médico.

¿Qué debo hacer si utilicé más cantidad de la necesaria o ingerí accidentalmente el producto?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutierrez" Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Hospital Nacional "Prof. A. Posadas" Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital Fernández: (011) 4808-2655 // 4801-7767

¿Qué personas no pueden usar Povitol Incoloro?

No usar si usted sabe que es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula.

SI UD. ESTÁ EMBARAZADA O EN PERÍODO DE LACTANCIA CONSULTE CON SU MÉDICO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

¿Tiene usted alguna pregunta?

Comuníquese sin cargo al 0800-122-8008 o con ANMAT Responde 0800-333-1234.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

Conservación:

No exponer a temperaturas mayores de 30 °C.

Elaborado en:

LABORATORIO BIOSINTEX S.A.

Salom 657 (C1277ABG) – Cuidad Autónoma de Buenos Aires.

Director Técnico: Leticia Fabbri - Farmacéutica M.N. 11.455

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.
Certificado N°: 58.505

Presentación: Envase conteniendo solución en spray por 60 ml.

Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: 18/04/18

Servicio de atención al consumidor:

0810 777 6327

consultas@biosintex.com.ar

www.biosintex.com.ar