Ibulgia

Ibuprofeno 4%
Suspensión Oral

Venta libre
Industria Argentina

Edad (años)	Peso (Kilos)	Dosis (mililitros)
Menores de 2	Menos de 11	Consulte a su médico
2 a 3	11 a 15	2,5
4 a 5	16 a 21	3,75
6 a 8	21 a 27	5
9 a 10	27 a 32	6,5
Más de 10	Más de 32	7,5

Suspensión Oral
Sabor Naranja
¿Qué contiene IBULGIA 4% - Sabor Naranja?
Cada 100 ml de Suspensión oral contiene:
Ibuprofeno 4,00 gramos, Goma xántica, Glicerina, Sorbitol 70%, Sacarina sódica, Benzoato de sodio, Polisorbato 80, Ácido cítrico anhidro, Esencia de Naranja, Amarillo ocaso, Agua purificada.

Suspensión Oral
Sabor Tutti Frutti
¿Qué contiene IBULGIA 4% - Sabor Tutti frutti?
Cada 100 ml de Suspensión oral contiene:
Ibuprofeno 4,00 gramos, Goma xántica, Glicerina, Sorbitol 70%, Sacarina sódica, Benzoato de sodio, Polisorbato 80, Ácido cítrico anhidro, Sabor Tutti frutti, Colorante Rojo Punzó 4R, Agua purificada.

ACCIONES:
- Analgésico (calma el dolor)
- Antifebril (baja la fiebre)
- Antiinflamatorio (reduce la inflamación)

¿Para qué se usa IBULGIA 4%?
Este medicamento está indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, musculares, de dientes, menstruales), dolores asociados a estados gripales y para bajar la fiebre.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Cómo usar este medicamento?
Administrar de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla. Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de no ser posible tomar como referencia la edad. En aquellos niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas. En caso necesario repetir la dosis cada 8 horas. No administrar más de 3 veces al día.

El producto se presenta junto a una medida dosificadora graduada para facilitar la administración de la suspensión.

AGITAR BIEN EL PRODUCTO PREVIAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN

¿Qué personas no pueden recibir IBULGIA 4%?
NO USE este medicamento si:

- Es alérgico al ibuprofeno, aspirina, a otros antiinflamatorios similares o a otros ingredientes del producto.
- Tiene o ha tenido úlcera en el estómago.
- Está tomando otros productos conteniendo ibuprofeno u otros antiinflamatorios.
- Padece de enfermedades de hígado, riñón o corazón.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?
Consulte a su médico en estos casos:

- Es mayor a 65 años.
- Tiene asma o alergia.
- Tiene presión arterial.
- Tiene problemas circulatorios.
- Tiene problemas de estómago (ardor estomacal, acidez).
- En el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción.
- El dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre, erupción, náuseas y/o vómitos.
- Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos. Ante esta eventualidad consulte a su médico.
- Si usted consume tres (3) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted recibe algún otro medicamento , está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?
Consulte a su médico en estos casos:
- No obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran.
- En el caso de dolor de garganta, si dura más de 2 días con igual intensidad.
- No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre ni durante más de 5 días para el dolor.
- Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.
- Aparecen síntomas nuevos.
- Este medicamento puede producir náuseas, acidez, dolor estomacal, síntomas en el tránsito intestinal. Si ocurre esto consulte a su médico y suspenda su uso.
- Experimenta alergias como erupción en la piel y picazón, que puede acompañarse de dificultad para respirar, hinchazón de labios, lengua, garganta o cara.
- Experimenta empeoramiento de su asma.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?
Comuníquese telefónicamente con un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Centros de Toxicología:
Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez": (011) 4962-9247 / 9248 / 9212.
Hospital General de Niños Pedro Elizalde: (011) 4300-2115 / / 4362-6063 int. 6217
Hospital Nacional Posadas : (011) 4654-6648 / 4658-7777 / Línea Gratuita Nacional: 0 800 333 0160.
Centro de Asesoramiento y Asistencia toxicológica - Ciudad de La Plata: (0221) 451-5555 / 5901 (interno 1312) / Línea gratuita: 0-800-222-9911

Presentaciones:
IBULGIA 4% Suspensión Oral: Envase conteniendo un frasco con 90 ml Sabor Naranja o con 90 ml Sabor Tutti frutti, junto con una medida dosificadora.

Modo de conservación: Conservar en ambiente seco a temperaturas inferiores a 30°C.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO UTILIZAR DESPUÉS DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud - Certificado N° 54.597

Elaborado en: BIOSINTEX S.A. – Salom 657 C1277ABG C.A.B.A.

Dirección Técnica: Farmacéutica Leticia Fabbri M.N.11455
Fecha de última revisión 07/19
¿Tiene usted alguna pregunta?

ANMAT Responde: 0800 333 1234
Servicio de Atención al Consumidor: 0800 777 6327

E-MAIL: consultas@biosintex.com.ar

www.biosintex.com.ar

224120 28/04

Biosintex