

# Nafazolex®

Nafazolina HCl 0,1%

Solución Nasal

Venta bajo receta  
Industria Argentina

## FORMULA CUALICUANTITATIVA

Nafazolina 0,1%

Cada 100ml contiene:

Clorhidrato de Nafazolina .....0,1 g

Cloruro de benzalconio .....0,01 g

Edetato disódico .....0,05 g

Cloruro de sodio .....0,77 g

Cloruro de potasio .....0,12 g

Hidróxido de sodio c.s.p pH 5,5 -7,0

Agua purificada c.s.p.....100 ml

## Acción terapéutica:

Descongestivo de la mucosa nasal.

## Indicaciones:

Alivio sintomático y transitorio de la congestión nasal, del resfriado común, sinusitis, fiebre de heno u otras alergias del tracto respiratorio superior.

## Propiedades:

La Nafazolina es una droga simpaticomimética sintética con un núcleo imidazol. Este núcleo le confiere no sólo acciones adrenérgicas, sino también colinérgicas. La Nafazolina posee una potente acción vasoconstrictora periférica mediada por un estímulo en el nivel de subtipo alfa 1 de receptores adrenérgicos. Esta acción se ejerce de manera fundamental sobre la mucosa nasal y tiene una duración prolongada (3 a 4h). Por otro lado puede producir vasodilatación secundaria o de rebote con obstrucción nasal consecutiva, y se puede afectar también la actividad ciliar. La Nafazolina se absorbe por todas las vías, incluido el tracto gastrointestinal, la vía parenteral y la aplicación sobre las mucosas nasal y ocular.

## Dosificación:

Congestión nasal: 2 ó 3 gotas en cada fosa nasal, cada 3 a 4 horas.

## Reacciones adversas:

Pueden observarse reacciones adversas por aplicación local y, cuando se ha ingerido por error, las manifestaciones son locales y generalizadas. Trastornos locales: irritación de la mucosa, obstrucción nasal secundaria con hiperemia, que pueda terminar en una rinitis vasomotora crónica.

En caso de ingestión accidental o absorción nasal en lactante se produce un cuadro de intoxicación grave con a) manifestaciones nerviosas: somnolencia, depresión del sensorio, depresión respiratoria y coma; b) manifestaciones cardiovasculares: hipotensión marcada y arritmias de diferente tipo (bradicardia), y c) otras: miosis, hipoglucemia, hipotermia.

## Precauciones y advertencias:

La Nafazolina es efectiva como descongestivo cuando se usa en las dosis recomendadas. Si se usa en gran cantidad, durante largo tiempo o con mucha frecuencia, puede dañar la mucosa nasal y causar ardor, estornudos y aumento de la rinorrea. Nunca debe ser administrada por boca. Se ha descrito adicción a las gotas nasales. Debe ser mantenida lejos del alcance de los niños. No debe usarse en menores de 12 años. La sobredosis en niños pequeños puede ser una emergencia que requiera rápido tratamiento. En caso de persistir la congestión nasal luego de 3 días de administrado, el fármaco deberá discontinuarse y consultar con el médico. Luego de usarse, debe lavarse el frasco gotero con agua caliente.

## Acciones colaterales y secundarias:

La sobredosis en niños puede causar: sudoración, bradicardia, somnolencia e hipotensión de rebote.

## Contraindicaciones:

No usar en pacientes con glaucoma, bloqueo A-V, diabetes tipo II, o que presenten hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación. No administrar a niños menores de 12 años.

## Sobredosificación:

“Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los

centros de Toxicología.”

Hospital de Pediatría:

Ricardo Gutiérrez (011)4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

## Presentación:

Envase gotero conteniendo 20 ml.

## Conservación:

Conservar a temperatura ambiente entre 5 y 30 °C.

**MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O SU FARMACÉUTICO.**

**ÉSTE MEDICAMENTO HA SIDO PRESCRIPTO SOLO PARA SU PROBLEMA MÉDICO ACTUAL, NO LO RECOMIENDE A OTRAS PERSONAS.**

Especialidad medicinal autorizada por

Ministerio de Salud. Certificado N° 53.396

Fecha de última revisión: 03-2018

Elaborado en: BIOSINTEX S.A.

Salom 657 C1277 ABG- C.A.B.A

Dirección Técnica:

Farmacéutica Leticia Fabbri M.N.11455

Servicio de atención al consumidor

0810 777 6327

consultas@biosintex.com.ar

www.biosintex.com.ar