

Tavinex®

EXPECTORANTE

Ambroxol Clorhidrato

Jarabe 15 mg / 5 ml

INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA LIBRE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO.

¿QUÉ CONTIENE TAVINEX EXPECTORANTE?

Cada 100 mililitros de Jarabe contiene:
CLORHIDRATO DE AMBROXOL 300 mg, hidroxietilcelulosa 200 mg, sorbitol 70% 50 g, glicerina 15 g, benzoato de sodio 240 mg, sabor frambuesa 350 mg, polietilenglicol 400 3 g, ácido tartárico 100 mg, rojo punzo 4R Cl 16255 2,5 mg, agua purificada c.s.p. 100 ml.

NO USAR SI LA TAPA O EL FRASCO NO ESTÁN INTACTOS.

ACCIÓN: Mucolítico y expectorante.

¿PARA QUÉ SE USA TAVINEX EXPECTORANTE?

Alivio sintomático del catarro y la tos (por fluidificación), facilitando su expectoración.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR TAVINEX EXPECTORANTE?

Menores de 2 años de edad. Pacientes que padecen úlcera gastroduodenal, dificultad para expectorar, asma bronquial, enfermedades del hígado o riñones, pacientes en tratamiento con Disulfiram.

Si usted está tomando algún otro medicamento, o está embarazada o dando de amamantar, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

NO USE este medicamento si usted es alérgico al Ambroxol, a alguno de los ingredientes o presenta intolerancia conocida al Sorbitol.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte a su médico antes de usar TAVINEX EXPECTORANTE si:

- Tiene fiebre, escalofríos o sudor nocturno.
- Tiene mucosidad o sangre al toser o limpiarse la cavidad nasal.
- Está recibiendo medicamentos para la tos o se encuentra bajo tratamiento médico debido a alguna afección.
- Presenta antecedentes de enfermedad renal.
- Presenta antecedentes de úlcera gastrointestinal.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?

Interrumpa el uso y consulte a su médico si:

- La tos y el malestar persiste por 48 horas o empeora.
- Si presenta reacciones en la piel y/o mucosas (cambio de color, picazón, ronchas, ampollas o despegamiento) conocidas como Eritema Multiforme, Síndrome De Steven Johnson, Necrosis Epidérmica Tóxica), hinchazón de mucosas, dificultad para tragar, falta de aire, choque anafiláctico.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Dosis niños:

De 2 a 6 años: Administrar 2,5 ml tres veces por día. No exceder la dosis máxima de 7,5 ml/día.

De 6 a 12 años: Administrar 5 ml dos o tres veces por día. No exceder la dosis máxima de 15 ml/día.

Niños mayores de 12 años y adultos:

Durante los 2 o 3 primeros días de tratamiento, administrar 10 ml tres veces por día.

A continuación la dosis puede ser reducida a 5 ml tres veces por día o 10 ml dos veces por día. No exceder la dosis máxima de 30 ml/día.

Modo de administración:

El jarabe debe ingerirse siempre después de una comida. Se aconseja tomar con abundante líquido (Té, jugo o agua).

SI EN 48 HS LOS SÍNTOMAS NO MEJORAN O EMPEORAN, POR FAVOR CONSULTE A SU MÉDICO.

La presentación de TAVINEX EXPECTORANTE posee una tapa de seguridad que impide la ingestión accidental de su contenido, manteniéndolo así al resguardo de los niños.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Para abrir el frasco, presione la tapa de seguridad y al mismo tiempo hágala girar en el sentido inverso a las

agujas del reloj como indica la flecha en la parte superior.

2. Para cerrar el frasco coloque la tapa nuevamente en posición y hágala girar en el sentido de las agujas del reloj hasta hacer tope.

3. El envase quedará cerrado, manteniendo su contenido al resguardo de los niños, ya que al girar la tapa sin presionarla no se puede extraer la misma.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI USÉ MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Toxicología, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

CENTROS DE TOXICOLOGÍA:

Teléfonos en Buenos Aires:

(Marque 011 si reside en el interior del país)

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez – Sánchez de Bustamante 1399 – Buenos Aires.

4962-2247 o 4962-6666.

Policlínico Posadas – Martínez de Hoz y Marconi, Haedo.

Conmutador 4658-3001/20 – Toxicología interno 314 o 4654-6648, 4658-7777.

Facultad de Medicina de Bs. As. – (Hospital de Clínicas Graí. San Martín) – Paraguay 2351 -

Buenos Aires.

División Toxicológica – Dto. De Medicina 3er piso, sala II – 4961-5452/6001/04/34/46

4962-4022/29/81/83/96 Int. 480

Servicio de Toxicología del Hospital Pedro Elizalde (Ex casa Cuna) – Av. Montes de Oca 40 – Buenos Aires.

4301-2215

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

0800-333-1234 ANMAT RESPONDE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

FORMA DE CONSERVACIÓN: A temperatura ambiente.

Una vez abierto el frasco de jarabe, se puede utilizar durante 6 semanas.

Presentación: 1 frasco conteniendo 100 ml.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 47.945

Si este medicamento le produjo algún EFECTO ADVERSO / NO DESEADO o NO CAUSÓ EFECTO, comuníquese con el ANMAT mediante el FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN ON-LINE disponible en <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/notificar.asp>

Elaborado en: Biosintex S.A.
Salom 657 C1277ABG - C.A.B.A.
Dirección Técnica:
Farmacéutica Leticia Fabbri M.N.11455

Servicio de atención al consumidor 0810 777 6327
consultas@biosintex.com.ar
www.biosintex.com.ar