

# Lacrigestina<sup>®</sup>

## COLIRIO

Tetrahidrozolina clorhidrato  
Solución oftálmica estéril  
DESCONGESTIVO OCULAR

INDUSTRIA ARGENTINA | VENTA LIBRE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO

¿Qué contiene LACRIGESTINA COLIRIO?

Cada 100 ml de Solución oftálmica contiene:

Tetrahidrozolina HCl 0,01 g, Ácido bórico, Borato de sodio, Cloruro de Sodio, Timerosal, Agua destilada c.s.p

ACCIÓN: Descongestivo ocular.

¿Para qué se usa LACRIGESTINA COLIRIO?

Alivio temporario del disconfort y el enrojecimiento, debido a irritaciones oculares leves.

¿Cómo usar este medicamento?

Administración en adultos: La dosis media terapéutica es de 1 a 2 gotas en el ojo u ojos afectados, hasta 4 veces al día.

Agitar bien el producto antes de usar. Si usa lentes de contacto debe quitárselos antes de aplicar LACRIGESTINA COLIRIO y colocárselos algunos minutos después.

Para la correcta colocación de las gotas se sugiere el siguiente procedimiento: Con la cabeza ligeramente reclinada hacia atrás, separar los párpados, dirigir la vista hacia arriba y colocar 1 gota por dentro del párpado inferior, dirigiendo enseguida la vista hacia abajo. Mantener abierto el ojo tratado, sin parpadear, durante 30 segundos. Si fuese necesario, aplicar de igual forma una segunda gota. Luego parpadear normalmente. Seguir el mismo procedimiento si el otro ojo también estuviese irritado.

El orificio del frasco gotero no debe tocar el ojo ni tocarse con los dedos. Después de cada aplicación cierre correctamente el envase. Un mismo envase no debe ser utilizado por más de una persona.

¿Qué personas no pueden recibir LACRIGESTINA COLIRIO?

NO USE este medicamento si:

- Es alérgico a la Tetrahidrozolina clorhidrato, a otras aminas simpaticomiméticas o a cualquiera de sus ingredientes.

- Padece de glaucoma (aumento de la presión ocular) o una infección microbiana ocular.

NO está indicado en pacientes tratados con IMAO, niños, embarazadas y mujeres en período de lactancia.

¿Qué cuidados debo tener antes de usar este medicamento?

Consulte a su oftalmólogo para saber si padece de alguna enfermedad ocular antes de utilizar este producto. La aplicación excesiva de descongestivos oftálmicos, puede aumentar el enrojecimiento ocular.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar este medicamento si:

- Tiene alguna enfermedad del corazón grave

- Tiene un tumor en las glándulas adrenales (Feocromocitoma)

- Tiene alguna enfermedad de tiroides (Hipertiroidismo)

- Tiene niveles de azúcar en sangre elevados (Diabetes Mellitus)

- Tiene la tensión arterial alta (Hipertensión)

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando este medicamento?

Ocasionalmente se han descrito cefaleas, mareos, temblor, palpitaciones o insomnio. En estos casos se deberá suspender la aplicación y consultar al oftalmólogo. Puede producir picazón o ardor ocular.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o una ingestión accidental?

LLAME POR TELÉFONO A UN CENTRO DE INTOXICACIONES, O VAYA AL LUGAR MÁS CERCANO DE ASISTENCIA MÉDICA:

Centros de Toxicología:

- Hospital "Dr. Ricardo Gutiérrez": (011) 4962-9247 / 9248 / 9212.

- Hospital Nacional Posadas : (011) 4654-6648 / 4658-7777 /

Línea Gratuita Nacional: 0 800 333 0160.

- Centro de Asesoramiento y Asistencia toxicológica - Ciudad de La Plata: (0221) 451-5555 / 5901 (interno 1312) / Línea gratuita: 0-800-222-9911

Presentación: Envase conteniendo un frasco gotero con 15 ml.

Modo de conservación: Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C. Proteger del calor y de la luz directa.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO UTILIZAR DESPUES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud - Certificado N° 27.926

Elaborado en Sub Oficial Perdomo 1619 Ituzaingó Prov. de Buenos Aires. Avenida 12 de Octubre 4444, Quilmes Oeste, Prov. de Buenos Aires.

Representante en Uruguay: Higia SRL - M.S.P. N°994/656

Comercio 2064 - Tel: 506.8044 - Ley 15.443 Reg. 40.005

Dirección Técnica: Q.F. Carla Volonterio

BIOSINTEX S.A. – Salom 657 C1277ABG C.A.B.A.

Dirección Técnica: Farmacéutica Leticia Fabbri M.N.11455

Fecha de última revisión 05/2019

¿Tiene usted alguna pregunta?

ANMAT Responde: 0800 333 1234

Servicio de Atención al Consumidor: 0800 777 6327

consultas@biosintex.com.ar - www.biosintex.com.ar

Servicio de atención al consumidor:

0810 777 6327

consultas@biosintex.com.ar

www.biosintex.com.ar